

## PRINSIP PENGOBATAN TB

Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap yaitu :

1. Tahap intensip. Pengobatan setiap hari selama 2-3 bulan.
2. Tahap lanjutan. Pengobatan tiga kali seminggu selama 4-5 bulan.


Jenis obat yang diberikan :

1. Rifampicin
2. Pirazinamid
3. Isoniazid & Streptomisin


### Efek Samping Obat



**Rifampicin** : Perubahan warna cairan tubuh (Keringat, air mata, atau urine) kemungkinan akan berubah warna menjadi merah (bukan darah)



**Pirazinamid** : Nyeri sendi



**Isoniazid** : Kerusakan pada saraf tepi (neuropati), sehingga muncul gejala kesemutan dan rasa terbakar khususnya di ujung anggota gerak tubuh.



**Streptomisin**: Gangguan Pendengaran. Fungsi pendengaran biasanya akan kembali normal jika konsumsi obat dihentikan

## JIKA PASIEN TB TIDAK PATUH MINUM OBAT

PASIEN TB HARUS MINUM OBAT ANTITUBERKULOSIS SETIDAKNYA SELAMA 6 BULAN

JIKA TIDAK PATUH MINUM OBAT PASIEN AKAN KEBAL OBAT ANTI TUBERKULOSIS ( MULTI DRUG RESISTANT -TB MDR).

PASIEN TB MDR MENGALAMI RESISTEN TERHADAP MINIMAL DUA OBAT. AKHIRNYA, BANYAK PASIEN YANG TIDAK SEMBUH TOTAL. JIKA SUDAH TERKENA TB MDR PENGOBATAN PUN AKAN SEMAKIN LAMA, YAITU MENCAPI 2 TAHUN.

PASIEN TB-MDR BILA TIDAK PATUH MINUM OBAT(LAGI) MAKA BISA TERKENA EXTENSIVELY DRUG RESISTANT ATAU TB XDR.

JADI JIKA PASIEN TERDIAGNOSIS TB, HABISKAN OBAT SELAMA 6 BULAN MESKIPUN DALAM WAKTU DUA SAMPAI TIGA BULAN KELUHANNYA SUDAH HILANG

### Akibat Minum Obat Tidak Teratur

Pasien dapat menularkan TBC ke banyak orang lainnya terutama keluarga yang tinggal serumah.

2. Penyakit TBC akan sulit diobati karena kuman TBC kebal terhadap obat.
3. Pengobatan menjadi lebih mahal dan lama
4. Pasien akan mengulang pengobatan TBC

## Gaya Hidup Sehat dan Pencegahan TBC

1 Makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh

2 Membuka jendela agar rumah mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar

3 Menjemur alas tidur agar tidak lembab

4 Mendapatkan suntikan vaksin BCG bagi bayi baru lahir hingga berusia 2 bulan untuk menghindari TBC berat (meningitis dan milier)

5 Olahraga teratur

6 Tidak Merokok



**TOSS  
TB!**

Temukan  
Obati  
Sampai  
Sembuh  
Tuberkulosis

BERSATU Menuju  
Indonesia BEBAS TB 2050